



NOTIFIQUE

COQUELUCHE

¿QUÉ ES?

Es una enfermedad respiratoria aguda causada por la **bacteria *Bordetella pertussis***.



Es altamente transmisible a través del contacto con gotitas de secreción respiratoria de una persona infectada a otra sana.



El periodo de incubación promedio es de 7 a 10 días, llegando en algunos casos a las 3 semanas.



Se transmite de persona a persona y el ser humano es el **único reservorio** de la bacteria.



¿POR QUÉ SE VIGILA?

- Porque es una de las mayores causas de morbilidad infantil. Cada año se estima la ocurrencia de 50 millones de casos y 300 mil muertes en el mundo.
- Porque es una enfermedad prevenible por vacunas y su vigilancia permite evaluar el impacto de los programas de vacunación.
- El mayor riesgo lo presentan los lactantes menores de un año.
- Porque puede producir brotes intradomiciliarios, institucionales o comunitarios y posee un gran potencial epidémico.

¿CÓMO PREVENIR?

La vacunación es la mejor manera de protegerse contra esta enfermedad.

En Chile, el Programa Nacional de Inmunizaciones establece lo siguiente:

- **Lactantes:** una dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad.
- **Escolares:** una dosis en 1º y 8º año básico
- **Embarazadas:** una dosis a las 28 semanas de gestación.



DEFINICIÓN DE CASO

- **Menor de 6 meses:** Lactante que presenta tos y coriza, afebril o febrículas acompañado de uno o más de los siguientes síntomas: estridor inspiratorio, vómitos post tusivo, apnea, cianosis o paroxismos de tos.
- **De 6 meses a 9 años:** Persona que presenta paroxismos de tos de al menos 7 días de duración, afebril o con febrículas y uno o más de los siguientes síntomas: estridor inspiratorio, apnea o vómitos posterior al acceso de tos; en ausencia de otra causa aparente.
- **Mayor de 9 años:** Persona que presenta tos paroxística, no productiva, de al menos 14 días de duración y uno o más de los siguientes síntomas: estridor inspiratorio, apnea, sudoración entre accesos de tos, vómitos post tusivo o empeoramiento nocturno de la tos.



¿CUÁNDO Y CÓMO NOTIFICAR?

El Coqueluche es una enfermedad de notificación obligatoria. El médico debe notificar cada caso confirmado según lo establecido en la normativa vigente. Los métodos recomendados para la confirmación de casos son: PCR y cultivo en la etapa aguda y serología en etapa de convalecencia.

¡NOTIFIQUE INGRESANDO A [HTTP://EPIVIGILA.MINSAL.CL](http://epivigila.minsal.cl) CON SU CONTRASEÑA! ¡AHORA MÁS FÁCIL Y SEGURO!



MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN <http://epi.minsal.cl/coqueluche>

PREVENGAMOS Y RECONOZCAMOS EL COQUELUCHE

¡DETECTAR A TIEMPO SALVA VIDAS!



¿QUÉ ES COQUELUCHE O TOS CONVULSIVA?

El coqueluche o tos convulsiva es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas, causada por la bacteria "Bordetella pertussis". En lactantes, el coqueluche puede ser grave e incluso mortal.

■ ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Se inicia como un cuadro de resfrío común pero evoluciona con inflamación de las vías respiratorias, tos violenta con sensación de ahogo que termina con un ruido fuerte durante la inspiración, lo que puede producir vomitos, cianosis (piel azulada) en labios o cuerpo de lactantes, señal de baja oxigenación en los tejidos.

ANTE ESTOS SÍNTOMAS CONSULTE DE INMEDIATO EN EL SERVICIO DE URGENCIA MÁS CERCANO

■ ¿CÓMO SE PREVIENE?

En Chile, existe una vacuna que está disponible de forma gratuita en todos los vacunatorios del país y es parte del Calendario de Vacunación para niños y niñas de 2, 4, 6 y 18 meses de edad, se coloca un refuerzo en 1º básico y también se protege a las embarazadas desde las 28 semanas de gestación.

¿CÓMO SE TRANSMITE?



EN FORMA DIRECTA A TRAVÉS DE GOTITAS DE SALIVA DE PERSONAS SINTOMÁTICAS.



EN FORMA INDIRECTA POR MANOS, SUPERFICIES U OBJETOS CONTAMINADOS POR SECRECIONES RESPIRATORIAS.



EL COQUELUCHE INGRESA POR LA MUCOSA NASAL, ORAL Y OCULAR.

Ante sospecha por presencia de síntomas, debe consultar urgente al centro de salud más cercano y aislar a persona afectada al menos 5 días desde el inicio del tratamiento antibiótico.

¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO DEL COQUELUCHE?



EVITE EL CONTACTO CERCANO CON PERSONAS ENFERMAS.



CÚBRASE LA NARIZ Y LA BOCA CUANDO TOSA Y ESTORNUDE. USE MASCARILLA SI TIENE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS



USE SOLO PAÑUELOS DESECHABLES.



LÁVESE LAS MANOS FRECUENTEMENTE Y USE ALCOHOL GEL.



LIMPIE Y DESINFECTE LAS SUPERFICIES, JUGUETES Y OBJETOS USO COMÚN.



VENTILE DIARIAMENTE CON AIRE NATURAL.



NO COMPARTIR VASOS TOALLAS NI UTENSILIOS



NO ASISTA CON NIÑOS/AS A LUGARES O EVENTOS MASIVOS.



QUÉDESE EN LA CASA SI ESTÁ ENFERMO.



MANTEGA LA LACTANCIA MATERNA



MANTENGA CALENDARIO DE VACUNAS AL DÍA

Más información en:

LLAME A SALUD RESPONDE

600-360-7777

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

¿QUÉ ES EL COQUELUCHE?

★ Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Bordetella pertussis* que se transmite desde un individuo infectado a otro al toser o estornudar.

La infección respiratoria **puede ser peligrosa para los grupos más vulnerables como:**

- Niños pequeños (principalmente con esquema de vacunación incompleto).
- Personas mayores.
- Mujeres embarazadas (último trimestre de gestación).
- Personas con enfermedad pulmonar crónica.



SIGNOS Y SÍNTOMAS:



Estado gripal
Sensación de fatiga



Tos y romadizo
Secreción nasal

Puede evolucionar a:

- Tos intensa, dura más de 7 o 14 días (más intensa en la noche).
- Vómito después de toser.
- Ruido al respirar.
- Apnea.

MEDIDAS PREVENTIVAS:



Lava frecuentemente tus manos con agua y jabón.



Limpia y desinfecta superficies; evita en los niños el intercambio de saliva a través de chupetes, mamaderas u otros objetos.



Ventila espacios cerrados y evita la exposición al humo del tabaco.

En caso de presentar síntomas respiratorios:



Evita lugares con aglomeraciones, cubre tu boca y nariz al toser o estornudar, elimina pañuelos desechables de inmediato.



Usar mascarilla y evitar el contacto con lactantes menores de seis meses.



¡PROTÉGETE CONTRA ESTA ENFERMEDAD!

VACUNA	Edad / grupo
Hexavalente	Niños/as de 2, 4, 6 y 18 meses
dTpa	- En 1° y 8° básico - Embarazadas desde 28 semanas de gestación

Vacuna incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones, de acceso gratuito y universal.